

# ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА



для защиты от туберкулеза в России используются вакцины БЦЖ и БЦЖ-М



## БЦЖ

- “классическая”
- одна доза содержит 0,05 мг микробных клеток
- для вакцинации и ревакцинации



## БЦЖ-М

- более “легкая”
- одна доза содержит 0,025 мг микробных клеток
- для вакцинации

## Показания к применению: профилактика туберкулеза у детей



для территорий с показателями заболеваемости туберкулезом выше 80 на 100 тысяч населения



при наличии в окружении новорожденного больных туберкулезом



для территорий с показателями заболеваемости туберкулезом менее 80 на 100 тысяч населения



### Схема вакцинации:

**V** – новорожденным на 3-7 день жизни

**RV** – в 6-7 лет (при отрицательном результате пробы Манту)



# ТУБЕРКУЛЁЗ



Туберкулёз – инфекционное заболевание, вызываемое микобактерией туберкулёза

## Симптомы:

- лихорадка и озноб, ночная потливость
- потеря аппетита, снижение веса
- усталость, быстрая утомляемость
- длительный кашель (более 3 недель)
- боль в груди, связанная с дыханием
- кровохарканье

**Часто туберкулёз протекает бессимптомно и выявляется случайно!**



## Пути передачи



- воздушно-капельный,
- реже – воздушно-пылевой, контактный, алиментарный, вертикальный



## Источник инфекции

больные лёгочной формой туберкулеза с наличием бактериовыделения

## Профилактика туберкулеза



### Вакцинация детей против туберкулеза

V – на 3-7 день жизни ребенка,  
RV – в 6-7 лет\*

\*при отрицательной пробе Манту



### Регулярные медицинские обследования

- Дети – туберкулинодиагностика
- Подростки – туберкулинодиагностика и флюорографическое обследование
- Взрослые – флюорографическое обследование



### Здоровый образ жизни

- Полноценное питание
- Полноценный сон и отдых
- Физическая активность
- Отказ от вредных привычек

